

## Idősorok

A dekompozíciós modellek lényege, hogy az [idősorok](#) négy, egymástól elkülöníthető komponensből tevődnek össze:

- a hosszú távú folyamatokat leíró trendből,
- az ettől szabályos ingadozással eltérő szezonális komponensből,
- a többnyire hosszú távú hullámzást kifejező ciklikus komponensből és
- a véletlen összetevőből.

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

A lineáris trend egyenlete nagyon egyszerű:

$$\hat{y}_t = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 \cdot t$$

A  $\hat{b}_0$  és  $\hat{b}_1$  paramétereket Excelben vagy bármilyen statisztikai programban néhány kattintással megkapjuk.

Ha kézzel szeretnénk őket kiszámolni, akkor pedig ezekre a normálegyenletekre lesz hozzá szükség:

$$\sum_{t=1}^n y_t = n \cdot \hat{b}_0 + \hat{b}_1 \sum_{t=1}^n t \quad \sum_{t=1}^n t \cdot y_t = \hat{b}_0 \cdot \sum_{t=1}^n t + \hat{b}_1 \sum_{t=1}^n t^2$$

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

A szezonalitást úgy kell elképzelni, hogy az minden nyári szezonban ugyanannyit hozzáad, minden téliben pedig ugyanannyit elvesz a trendvonal által meghatározott értékből.

Pl. ha a négy évszakot vesszük, akkor négy szezonunk van, van egy téli, egy tavaszi, egy nyári és egy őszi, ezért négy szezonalitást kell számolnunk. Más [idősorok](#) esetében természetesen ez lehet több is és kevesebb is.

A szezonális képlete a következő:

$$s_j = \frac{\sum_{i=1}^{n/p} (y_{ij} - \hat{y}_{ij})}{n/p}$$

A képlet roppant barátságos, de némi magyarázatra szorul. Mindössze arról van szó, hogy minden egyes szezonra átlagoljuk a trendvonal és a tényleges értékek közötti eltéréseket.

Vagyis a képletben  $p$  a szezontípusok száma,  $n$  pedig az összes szezon száma,  $y_{ij}$  jelenti a tényleges értéket, ahol az  $ij$ -t úgy kell érteni, hogy az  $i$ -edik év  $j$ -edik szezonja.  $\hat{y}_{ij}$  pedig ennek a trend szerinti megfelelője.

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

Ha összeadjuk a nyers szezonális eltéréseket, és ezek összege nem nulla, akkor vesszük az átlagukat.

$$\bar{s} = \frac{s_1 + s_2 + s_3 + s_4}{4}$$

És ezt az átlagot mindegyik nyers szezonális eltérésből levonjuk.

$$\tilde{s}_1 = s_1 - \bar{s}$$

$$\tilde{s}_2 = s_2 - \bar{s}$$

$$\tilde{s}_3 = s_3 - \bar{s}$$

$$\tilde{s}_4 = s_4 - \bar{s}$$

Így kapjuk meg a korrigált szezonális eltéréseket

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

---

A tartam*idősorok* egy vizsgált időtartamra vonatkozó megfigyeléseket tartalmaznak.

Például egy év baleseteinek a számát, egy hónapban eladott fogkrémek számát, stb. Ilyenkor az adatok összeadása értelmes eredményt ad.

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

---

Az állapot*idősorok* egy vizsgált időtartam egy adott pillanatára vonatkozó megfigyeléseket tartalmazzák, például az ország lakosságának számát egy adott év adott pillanatában, vagy a raktáron lévő fogkrémkészletet egy adott hónap adott pillanatában, stb. és ilyenkor az adatok összeadásával nem kapunk értelmezhető eredményt.

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

---

Egy speciális átlag, például ha négy hónap adataiból számoljuk ki az átlagot, viszont csak három hónapos időtartamra.

Az állapotidősornál mindig kronologikus átlagot számolunk:

$$\bar{y}_k = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n}{n-1}$$

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

---

Jelentősen csökkenthetjük a normálegyenletek által okozott szenvedéseket, ha az idő múlását jelentő *t* paramétert úgy adjuk meg, hogy az összege éppen nulla legyen.

Ekkor

$$\sum y_t = n \cdot \hat{b}_0 \quad \sum t \cdot y_t = \hat{b}_1 \sum t^2$$

[Megnézem a kapcsolódó epizódot](#)

---